


## MEDICATIETOEDIENING VIA SONDE - flowchart voor toedienend personeel

- \* Ga na of medicatie via de mond in te nemen is
- \* Voeg geen medicatie toe aan de sondevoeding
- \* Vraag de medische dienst advies wanneer het om een bewoner gaat onder vochtbeperking of een kind, aangezien de nodige verdunnings- en spoelvolumes mogelijk moeten worden aangepast. Of volg de gegeven instructies hieromtrent op.

*Ga na of er een wachttijd vereist is tussen het stoppen van de voeding en het toedienen van medicatie. Zo ja, stop tijdig de voeding.*

Verzamel de medicatie en de nodige materialen (bv. spuit, handschoenen, water)

Bereid ieder geneesmiddel apart voor. Meng de geneesmiddelen niet (tenzij anders geadviseerd door medische dienst of apotheker).



Aanbevelingen in flowchart gebaseerd op:

- ◇ Bankhead R., Boullata J., Brantley S., Corkins M., Guenter P., Krenitsy J. et al. (2009) A.S.P.E.N. Enteral nutrition practice recommendations. JPEN Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 33, 122–67.
- ◇ White R. & Bradnam V. (2007) Handbook of Drug Administration via Enteral Feeding Tubes Pharmaceutical Press.
- ◇ British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (2013) Administering Drugs Via Enteral Feeding Tubes – A Practical Guide.
- ◇ Boullata J. I. & Hudson L. M. (2012) Drug-nutrient interactions: a broad view with implications for practice. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 112, 506–17.